

**EVERGREEN®**

## antistress

**adubo estival e pré-invernal**ADUBO CE  
ADUBO MINERAL COMPOSTO  
ADUBO NK 16+O+16(+1,O)  
CONTENDO UREA FORMALDEIDO**Composição:**

16%	<b>AZOTO TOTAL (N)</b> 7,9 % azoto amoniacal 2,4 % azoto ureico 5,7 % ureia formaldeido I 1,9% solúvel a 20°C II 1,9% não solúvel a 20°C / solúvel a 100°C
16%	<b>ÓXIDO DE POTÁSSIO (K<sub>2</sub>O)</b> Solúvel em água
1%	<b>FERRO (Fe)</b> Solúvel em água
0,30%	<b>MANGANÉS (Mg)</b> Solúvel em água

**Peso líquido: 2kg****6093**

KB é uma marca registada por Scotts France SAS

Distribuído por: **Liscampo Lda**  
Travessa do Carvalho, 31-35  
1200-097 Lisboa  
Tel: 213 47 12 71 - Fax: 213 47 81 70

## antistress

**λίπασμα για GAZON, για καλοκαίρι και πριν το χειμώνα**ΛΙΠΑΣΜΑ CE  
ΣΥΝΘΕΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ  
ΛΙΠΑΣΜΑ NKFe 16+O+16(+1,O)  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΡΕΪΚΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ**Σύνθεση:**

16%	<b>ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)</b> 7,9% Αμμωνιακό Άζωτο 2,4% Άζωτο σε μορφή ουρίας 5,7% Άζωτο από ουρεϊκή φορμαλδεύδη από το οποίο: I 1,9 % διαλυτό στους 20°C II 1,9 % αδιάλυτο στους 20°C / διαλυτό στους 100°C
16%	<b>ΚΑΛΙΟ (K<sub>2</sub>O)</b> Διαλυτό στο νερό
1%	<b>ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)</b> Διαλυτός στο νερό
0,30%	<b>ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO)</b> Διαλυτό στο νερό

**Καθαρό βάρος: 2 Κιλά****99.059**

KB Εμπορικό Σήμα κατοχυρωμένο από την Scotts France SAS

Διανέμεται από την  
**Green Agro A.E.**  
ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου - Τ.Κ. 57022  
Τηλ 2310.784.841 - 2  
Email: info@greenagro.gr**EVERGREEN®**

# antistress

**concime estivo e pre-invernale per prato  
abono para verano y pre-invierno para césped  
adubo estival e pré-invernal para relvados  
λίπασμα για GAZON, για καλοκαίρι και πριν το χειμώνα****Protegge i prati da stress termici e idrici.****Protege al césped del stress térmico e hídrico.****Protege o relvado do stress térmico e hídrico****Προστατεύει το GAZON από στρες θερμοκρασίας και νερού.****100m<sup>2</sup>****EVERGREEN®**

## antistress

**concime estivo e pre-invernale**CONCIME CE  
CONCIME MINERALE COMPOSTO  
CONCIME NK 16+O+16(+1,O)  
CONTENENTE UREA FORMALDEIDE**Composizione:**

16%	<b>AZOTO TOTALE (N)</b> 7,9% azoto ammoniacale 2,4% azoto ureico 5,7% azoto dell'urea formaldeide di cui: I 1,9% solubile a 20°C II 1,9% non solubile a 20°C / solubile a 100°C
16%	<b>OSSIDO DI POTASSIO (K<sub>2</sub>O)</b> Solubile in acqua
1%	<b>FERRO (Fe)</b> Solubile in acqua
0,30%	<b>MANGANESE (Mg)</b> Solubile in acqua

**Peso netto: 2kg****6359**

KB è un marchio registrato SCOTTS

Distribuito da:  
**Ital-Agro s.r.l.**  
Via V. Veneto, 81  
26857 Salerano sul Lambro  
Tel.: 0371/71090  
www.ital-agro.it

## antistress

**abono de verano y pre-invierno**ABONO CE  
ABONO MINERAL COMPUESTO  
ABONO NK 16+O+16(+1,O)  
CONTENIENDO UREA FORMALDEHIDO**Composición:**

16%	<b>NITROGENO TOTAL (N)</b> 7,9% nitrogeno amoniacal 2,4% nitrogeno ureico 5,7% urea formaldehido del cual I 1,9% soluble a 20°C II 1,9% no soluble a 20°C / soluble a 100°C
16%	<b>OXIDO DE POTASIO (K<sub>2</sub>O)</b> Soluble en agua
1%	<b>HIERRO (Fe)</b> Soluble en agua
0,30%	<b>MANGANESE (Mn)</b> Soluble en agua

**Peso neto: 2kg****6093**

KB es una marca registrada por Scotts France SAS

Distribuido por:  
**Ibercampo, S.L.**  
C/ Cayulles, 32  
E-28007 Madrid  
Tel.: +34.912.836.644  
www.ibercampo.es**EVERGREEN®****VANTAGGI:**

- Aumenta la tolleranza alle alte e basse temperature
- Incrementa la tolleranza agli stress idrici
- Garantisce uniformità di crescita
- Tecnologia Methyl-Urea e potassio a lenta cessione
- Si scioglie completamente dopo l'irrigazione
- Eccellente uniformità di distribuzione

**Formula 3 in 1 - NKFe****N-Azoto:** Spinge la crescita e la colorazione**K-Potassio:** Aumenta la resistenza alla siccità e malattie**Fe-Ferro:** Stimola il rinverimento**Caratteristiche:** concime di elevata qualità, utilizzato anche per manti erbosi professionali. Appositamente studiato per nutrire nei momenti in cui il manto erboso è affaticato da lunghi periodi di stress: temperature estreme (alte o basse) e/o mancanza d'acqua. L'alto titolo in potassio (K) conferisce robustezza alle piante.**Modalità:** applicare alla dose indicata in estate e ad inizio inverno. Irrigare, avendo cura di rimuovere prima eventuali residui di prodotto da vialetti e camminamenti. Per lo spargimento impiegare spandiconcimi Scotts a spaglio o a caduta. Ogni granulo contiene tutti gli elementi nutritivi e si scioglie completamente dopo la prima irrigazione.

Dosi	Copertura	Utilizzo	Durata
20 g/m <sup>2</sup>	2 kg per 100 m <sup>2</sup>	da Mag. a Lug. da Ott. a Nov.	2 mesi

**VENTAJAS:**

- Aumenta la tolerancia de altas y bajas temperaturas
- Incrementa la tolerancia al stress hídrico
- Garantiza la uniformidad del crecimiento
- Tecnologia Methyl-Urea y potasio de liberación lenta
- Se disuelve completamente después del riego
- Excelente uniformidad de distribución

**Formula 3 en 1 - NKFe****N-Nitrogeno:** Favorece el crecimiento y la coloración**K-Potasio:** Aumenta la resistencia a la sequía y a las enfermedades**Fe-Hierro:** Estimula el reverdecimiento**Características:** abono de alta calidad, usado en céspedes profesionales. Expresamente estudiado para nutrir en el momento en el cual el césped está fatigado por largos periodos de stress: temperaturas extremas, altas o bajas y/o falta de agua. Su alta concentración en Potasio (K) le confiere robustez a las plantas.**Modo de Aplicación:** aplicar a la dosis indicada en el verano y hasta el inicio del invierno. Regar teniendo cuidado de retirar en primer lugar cualquier resto del producto en paseos o senderos. Esparcir el abono por medio de la abonadora Scotts más adecuada. Cada gránulo contiene todos los elementos nutritivos y se disuelve totalmente después del primer riego.

Dosis	Cobertura	Uso	Duración
20 g/m <sup>2</sup>	2 kg para 100 m <sup>2</sup>	De May a Julio De Oct. a Nov.	2 meses

**VANTAGENS:**

- Aumenta a tolerância às altas e baixas temperaturas
- Incrementa a tolerância ao stress hídrico
- Garante uniformidade de crescimento
- Tecnologia Metil-ureia e potássio de libertação lenta
- Dissolve-se completamente após irrigação
- Excelente uniformidade de distribuição

**Formula 3 em 1 - NKFe****N-Azoto:** Favorece o crescimento e a coloração**K-Potássio:** Aumenta a resistência à seca e às doenças**Fe-Ferro:** Acção reverdecidora**Características:** adubo de elevada qualidade, utilizado também em mantos herbáceos profissionais. Especialmente estudado para nutrir nos momentos em que o relvado está afectado por longos períodos de stress: temperaturas extremas (altas ou baixas) e/ou falta de água. O alto teor em potássio (K) confere robustez às plantas.**Modo de emprego:** aplicar à dose indicada no verão e no início do inverno. Irrigar, tendo o cuidado de remover primeiro eventuais resíduos de produto de pavimentos e caminhos, para evitar manchas. Para espalhamento utilizar os espalhadores de adubos Scotts. Cada grânulo contém todos os elementos nutritivos e dissolve-se completamente após a primeira irrigação.

Dose	Cobertura	Utilização	Duração
20 g/m <sup>2</sup>	2 kg por 100 m <sup>2</sup>	Maio a Julho Outubro a Novembro	2 meses

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**

- Αυξάνει την αντοχή στις ακραίες θερμοκρασίες (υψηλές και χαμηλές)
- Αυξάνει την αντοχή στο υδατικό στρες
- Εγγυάται ομοιόμορφη ανάπτυξη
- Τεχνολογία Methyl-Urea και Κάλιο σταδιακής απελευθέρωσης
- Διαλύεται πλήρως με το πότισμα
- Εξαιρετική ομοιομορφία στη διασπορά

**Σύνθεση 3 σε 1 - NKFe****N-Άζωτο:** Ευνοεί την ανάπτυξη και το χρώμα**K-Κάλιο:** Αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία και τις ασθένειες**Fe-Σίδηρος:** Ενισχύει το ξαναπρασίωμα**Χαρακτηριστικά:** Λίπασμα υψηλής ποιότητας, που χρησιμοποιείται ακόμα και σε επαγγελματικό Gazon. Ειδικά μελετημένο για την θρέψη την εποχή που το Gazon καταπονείται από μεγάλες περιόδους στρες: Ακραίες θερμοκρασίες (υψηλές ή χαμηλές), ή έλλειψη νερού. Η υψηλή περιεκτικότητα καλίου (K) παρέχει ευρωστία στα φυτά.**Τρόπος χρήσης:** Εφαρμόστε το στις συνιστώμενες δόσεις το καλοκαίρι και στην αρχή του χειμώνα. Ποτίστε φροντίζοντας να απομακρύνετε πρώτα, τις όποιες ποσότητες του προϊόντος έπεσαν εκτός Gazon (π.χ. δρόμοι, διάδρομοι κτλ). Για να διανεμίσετε το λίπασμα σωστά χρησιμοποιήστε τον Λιπασματοδιανομέα χειρός Scotts. Κάθε κόκκος περιέχει όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Οι κόκκοι διαλύονται πλήρως με το πρώτο πότισμα.

Δόση	Κάλυψη	Περίοδος χρήσης	Διάρκεια
20 γρ / τ.μ.	2 Κιλά για 100 τ.μ.	Μάιο έως Ιούλιο Οκτώβριο έως Νοέμβριο	2 μήνες